

Azacitidine (VIDAZA®)

CHECK-LIST : Sécurisation de l'administration de chimiothérapie en HAD

A consulter : Bonne pratique ONCOAURA [MODALITÉS D'ADMINISTRATION PAR VOIE PARENTÉRALE DES MÉDICAMENTS DE CHIMIOTHÉRAPIE CYTOTOXIQUE](#)



Avant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Vérification de l'Identité du patient	Demander au patient de décliner son identité : nom, prénom, date de naissance	<input type="checkbox"/>
2- Hygiène et EPI	Hygiène des mains Port de gant d'examen à usage unique sans vinyle et d'une blouse	<input type="checkbox"/>
3- Contrôle de la chimiothérapie	Intégrité du produit Date de péremption Modalité de conservation Concordance avec la prescription	<input type="checkbox"/>
4- Prise de constantes	Poids (<i>si perte de poids $\geq 10\%$ contacter le prescripteur</i>), TA, FC, Température	<input type="checkbox"/>
5- Prémédication	Vérifier la prise de la prémédication par le patient ou réaliser la prémédication prescrite	<input type="checkbox"/>
6- Préparation à l'administration	Mettre la seringue à température ambiante Homogénéiser la suspension (faire rouler les seringues entre les paumes de la main) Utiliser une aiguille de 25G et ne pas purger l'aiguille avant administration Désinfecter la zone d'administration	<input type="checkbox"/>

Pendant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Voie d'administration	Injection sous-cutanée : haut du bras, cuisse, abdomen. Introduire l'aiguille avec un angle de 45 à 90°. Alternier les sites d'injection (au moins 2,5cm de distance du site précédent). Les doses supérieures à 4mL doivent être injectées dans deux sites différents. Ne pas injecter sur une zone sensible : ecchymose, rougeur, ou induration.	<input type="checkbox"/>
2- Durée d'administration	3 à 5 minutes	<input type="checkbox"/>
3- Surveillance particulière	Réaction locale au point d'administration	<input type="checkbox"/>

Après l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Surveillance immédiate	Réaction cutanée au point d'administration	<input type="checkbox"/>
2- Traçabilité de l'administration	Heure d'administration, quantité administrée	<input type="checkbox"/>

3- Surveillance durant l'intercure	Education du patient aux survenues des EI fréquents	<input type="checkbox"/>
4- Elimination des déchets	Filière d'élimination des dispositifs souillés par de la chimiothérapie	<input type="checkbox"/>

Certaines étapes peuvent être réalisées par un autre professionnel de santé en fonction des organisations