

Trastuzumab - Pertuzumab sous-cutanée (PHESGO®)

Indications : cancer du sein HER2 positif précoce ou métastatique

Protocole :

- Posologie initiale J1 : 1200/600 mg mg/administration
- Posologie d'entretien : 600/600 mg / administration toutes les 3 semaines (J1 = J22)
- Jour d'administration du traitement en HAD : **à partir C2** (dose de charge et tolérance évaluée en HDJ à C1 et lors des consultations)

En cas d'oubli ou retard de dose : si le délai entre deux injections consécutives est supérieur ou égale à 6 semaines : une dose de charge de Phesgo 1 200 mg/600 mg doit être à nouveau administrée, suivie par une dose d'entretien de Phesgo 600 mg/600 mg toutes les 3 semaines.

- Prémédication : Selon prescription médicale si nécessaire

Forme pharmaceutique commerciale : solution injectable

Présentation de la chimiothérapie : solution limpide à opalescente, incolore à légèrement brunâtre, en flacon prête à l'emploi.

Conservation et stabilité : 18 mois au réfrigérateur (2 à 8 °C), à l'abri de la lumière

Dénomination	Stabilité
PHESGO 1200 mg / 600 mg	24h à température inférieure à 30°C Ou
PHESGO 600 mg / 600 mg	28 jours entre 2°C et 8°C

Attention aux risques d'erreurs de dosage : bien vérifier les flacons

Modalités d'administration : injection sous-cutanée dans la cuisse

- **Ne pas purger l'aiguille** afin de réduire l'incidence des réactions locales
- **Alterner les sites d'injection** (cuisse droite / cuisse gauche) avec au moins 2.5 cm d'écart avec un ancien site d'injection et **jamais à des endroits où la peau est rouge, avec un bleu, sensible ou dure.**
- La dose de charge et la dose d'entretien doivent être administrées pendant respectivement 8 minutes et 5 minutes.

Effets indésirables graves

Prévenez immédiatement un médecin ou un/une infirmier/ère si vous remarquez un des effets indésirables suivants :

- Problèmes cardiaques : rythme cardiaque accéléré ou ralenti ou battements irréguliers et les symptômes peuvent inclure une toux, un essoufflement et un gonflement (rétention d'eau) de vos jambes ou de vos bras.
- Réactions liées à l'injection : elles peuvent être légères ou plus sévères et inclure une sensation de malaise, de la fièvre, des frissons, une sensation de fatigue, des maux de tête, une perte d'appétit, des douleurs articulaires et musculaires et des bouffées de chaleur.
- Diarrhée : elle peut être légère ou modérée mais peut être également très sévère ou persistante (7 selles aqueuses ou plus par jour).
- Neuropathie périphériques

- Faible quantité de globules blancs mise en évidence par un examen sanguin. Avec ou sans fièvre.
- Réactions allergiques : gonflement de votre visage et de votre gorge, accompagné d'une difficulté à respirer, pouvant être le signe d'une réaction allergique grave.
- Très rare : syndrome de lyse tumorale (affection pouvant survenir lorsque les cellules cancéreuses meurent rapidement). Les symptômes peuvent inclure :
 - des problèmes rénaux
 - les signes incluent une faiblesse, un essoufflement, de la fatigue et une confusion,
 - des problèmes cardiaques
 - les signes incluent des battements irréguliers avec un rythme cardiaque accéléré ou ralenti,
 - des convulsions (crises), des vomissements ou des diarrhées et des picotements dans la bouche, les mains ou les pieds