

## ***Pertuzumab (PERJETA®)***

**Indications** : Traitement du cancer du sein

**Protocole** :

- Posologie initiale : dose de charge initiale 840 mg,
- Posologie d'entretien : 420mg toutes les trois semaines  
En cas d'oubli ou retard de dose : si le délai entre deux injections consécutives est supérieur ou égale à 6 semaines : une dose de charge de 840 mg doit être à nouveau administrée, suivie par une dose d'entretien de 420 mg toutes les 3 semaines.
- Prémédication : selon prescription médicale

**Forme pharmaceutique commerciale** : solution injectable

**Présentation de la chimiothérapie** : solution limpide à opalescente, incolore à jaune pâle

- Solvant : NaCl 0.9 %

**Conservation et stabilité** : données des RCP (consultés le 15/05/2024)

- **Dilution dans NaCl 0.9 %, poche de 250mL**: 30 jours entre 2°C et 8°C, 24 heures à température ≤ 30°C depuis le moment de la préparation.

**Modalités d'administration** : par voie intraveineuse, 60 minutes pour la première injection puis 30 à 60 minutes si la première perfusion est bien tolérée

Rinçage de la ligne de perfusion après l'administration avec du NaCl 0,9%

**Surveillance et effets indésirables très fréquents** :

- Réaction liée à la perfusion
- Toxicité hématologique : neutropénie
- Diarrhées
- Surveillance cardiaque : FEVG régulièrement